

インレビック®
HANDBOOK

2026年6月作成
INR_HM_007_01

インレビック®
HANDBOOK

インレビックカプセルを 服用される患者さんへ

インレビックは、1日1回服用する骨髄線維症のお薬です。

この冊子では、インレビックによる治療を始めるにあたり、患者さんに知っておいていただきたいことをまとめました。

骨髄線維症という病気のこと、インレビックの働きや服用方法、副作用について、治療開始前にお読みいただき、理解を深めるのにお役立てください。

わからないことや、不安に思うことなどは、医師や看護師、薬剤師にご相談ください。



CONTENTS

インレビックカプセルを服用される患者さんへ	1
どういう人がインレビックで治療をするの?	3
骨髄線維症になるとどんな症状が出るの?	6
どんな検査をして骨髄線維症を調べるの?	7
インレビック治療による効果は?	9
インレビック治療前に確認すべきことは?	10
インレビックの服用方法は?	12
インレビックにはどのような副作用があるの?	13
インレビック服用中に注意すべきことは?	19
インレビック服用中にどんな検査をするの?	19
治療に高額な医療費が必要ですか?	20


どういう人がインレビックで治療をするの？

インレビックは、「骨髄線維症」と診断された患者さんを治療するお薬です。

骨髄線維症は、骨髄の中にある造血幹細胞がもつ遺伝子に異常が生じ、骨髄内に線維質が増えて血液をつくる機能がうまく働かなくなる病気です。


正常な骨髄

骨髄の中には造血幹細胞があります。造血幹細胞は、血液成分のもとになる細胞で、この細胞から赤血球、白血球、血小板などの血液細胞がつくられます。



骨髄線維症の骨髄

骨髄線維症は、造血幹細胞の異常によって、骨髄内に線維質が増えてしまう病気です。線維が増えた骨髄では、赤血球、白血球、血小板などの血液細胞を十分につくることができなくなり、骨髄の代わりに脾臓や肝臓で血液細胞がつくられることになります。



骨髄線維症の造血幹細胞ではいくつかの遺伝子変異がみられます。
そのひとつが、JAK2遺伝子の変異です。
JAK2遺伝子の変異すると、JAK2からの信号が過剰に働くことで骨髄の環境が変化(線維化)し、血液を作る働きが低下します。
JAK2以外の遺伝子変異として、JAK2からの信号を強くしてしまう遺伝子変異などが知られています。

骨髄線維症になるとどんな症状が出るの？

骨髄線維症になると、造血幹細胞の働きに異常が生じることで、貧血の症状(動悸・息切れ・倦怠感など)がみられます。
血液細胞を十分につくることができなくなった骨髄の代わりに、血液細胞をつくる働きを担う肝臓や脾臓が腫れることによって、腹部膨満感や腹痛、発熱や体重減少などの全身症状があらわれることがあります。



どんな検査をして骨髄線維症を調べるの？

骨髄線維症を診断するための検査には、血液検査、骨髄検査、画像検査、遺伝子検査などがあります。

血液検査

採取した血液を用いて、赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、白血球数および分画、血小板数などの数値の確認や抗原検査をします。また、診断時には血液細胞の変形を確認する血液形態検査も行います。



画像検査

腹部エコー・CT・MRI・骨髄シンチグラムなどの画像診断をします。骨髄の代わりに造血をする脾臓や肝臓の腫れや大きさを確認するため、腹部の画像診断が必要になります。



骨髄検査

骨髄に注射針を刺して、吸引した骨髄液を顕微鏡で見て、血液細胞がどのくらい産生されているか、異常があるかどうかを調べます。

骨髄の線維化が進行すると、骨髄液を吸引できなくなるので、その場合は骨髄の組織を採取して、線維化の状態を調べます。



遺伝子検査

骨髄線維症の約半数にJAK2遺伝子の異常が認められます。JAK2だけでなく、病気に関係する遺伝子の異常があるかどうかを確認します。遺伝子検査は採取した血液で行います。



インレビック治療による効果は？

インレビックはJAK2を阻害するお薬です。

骨髄線維症になると、JAK2から伝えられる信号が強くなるため、骨髄で血液細胞を十分につくることができなくなります。その結果、脾臓や肝臓が腫れてしまい、その腫れに伴う症状があらわれます。

インレビックを服用することで、JAK2からの過剰な信号を抑え、脾臓の腫れを小さくしたり、全身症状を改善したりすることが期待されます。

インレビック治療前に確認すべきことは？

患者さんの状態によっては、インレビックを服用できない、もしくは投与量を調節する必要があります。

以下の項目に該当する場合は、治療開始前に医師とご相談ください。

- ☐ 薬や食べ物などでアレルギー反応が出たことがある
- ☐ 結核にかかったことがある
- ☐ 感染症(敗血症、肺炎、ウイルス感染など)で治療中
- ☐ B型肝炎で治療中、または以前治療していた
- ☐ 肝臓の病気がある
- ☐ 腎臓の病気がある、透析治療をしている
- ☐ 現在、他の薬を服用している
- ☐ 妊娠している、または妊娠の可能性がある
- ☐ 授乳している

現在、ほかに飲んでいるお薬がある場合は、医師、看護師、薬剤師に伝えてください。

一緒に飲むと、それぞれのお薬の効果に影響が出ることがありますので、追加でお薬を服用する場合は、医師、看護師、薬剤師にご相談ください。

● インレビックの副作用が出やすくなるお薬

リトナビル、イトラコナゾール、クラリスロマイシン、フルコナゾール など

● インレビックの効果が弱くなるお薬

リファンピシン、フェニトイン、カルバマゼピン など

● インレビックと一緒に飲むことで、 相手のお薬の作用(副作用)を強めてしまうお薬

ミダゾラム、フェンタニル、トリアゾラム、オメプラゾール、ランソプラゾール、ジアゼパム、メトプロロール、アミトリプチリン、ペルフェナジン、メトホルミン、プロカインアミド など



インレビックの服用方法は？

● 1日1回服用してください。

通常、4カプセルを服用します。

患者さんの状態によっては、減量することがあります。

● 治療中は処方されたビタミンB₁(チアミン)を 毎日服用してください。

ビタミンB₁の吸収をよくするため、吐き気や下痢を抑える薬が処方されることがあります。

● 医師の指示に従って、服用してください。

- 飲み忘れた場合は、その日は服用せず、翌日の服用を予定していた時間帯に1回分を服用してください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- 妊娠する可能性のある人は、この薬を飲んでいる間および最後に飲んだ日から1カ月間は適切な避妊をしてください。



インレビック
カプセル100mg



インレビックには どのような副作用があるの？

インレビックを服用すると、以下のような症状が出ることがあります。
症状に気づいたら、すみやかに医師にご連絡ください。
症状が治まらない場合は、お薬を減らしたり、お休みする場合があります。

消化器症状	下痢、吐き気、おう吐、腹痛、便秘
全身の症状	貧血、頭痛、疲労感

そのほか、注意が必要な副作用があります(14～18ページ参照)。
以下の副作用が疑われる症状に気付いた場合は、服用を中止し、医師に
ご連絡ください。

注意が必要な副作用

- ウェルニッケ脳症
- 出血
- 骨髄抑制
- 肺炎
- 感染症
- 間質性肺疾患
- 肝機能障害
- ぶどう膜炎

注意が必要な副作用

● ウェルニッケ脳症

重大な副作用として、ビタミンB₁(チアミン)の欠乏によりウェルニッケ脳症があらわれることがあります。

発症直後にビタミンB₁を大量に点滴することで回復が期待できますので、
インレビックの服用中に以下の症状のいずれかが認められた場合は、
インレビックの服用を中止し、すみやかに医師に連絡してください。

次のような症状がみられる場合があります。

- 意識の低下
- 意識の消失
- 考える力の低下
- 記憶力の低下
- 異常な行動
- けいれん
- 自分の意思とは関係なく身体が動く
- 手足の動きがぎこちない
- しゃべりにくい
- ふらつき
- まっすぐ歩けない
- 目を自由に動かせない
- 二重に見える



—— ウェルニッケ脳症を予防するために ——

- インレビック服用中は、医療機関より処方されるビタミンB₁を必ず毎日服用してください。
- インレビックの服用を始める前に血液検査でビタミンB₁濃度を測定し、値が低ければビタミンB₁補充を行います。ビタミンB₁濃度が正常値に回復するまでインレビックの服用を始めることはできません。
- インレビック服用中にも、必要に応じてビタミンB₁濃度の測定を行うことがあります。
- 下痢、吐き気、おう吐、食欲不振の症状などは、栄養失調や体重減少を引き起こしビタミンB₁欠乏の原因となるため改善が必要です。これらの症状がインレビック服用中に、日常的にみられる場合は、医師に相談してください。インレビックによるおう吐や下痢を軽減するために、制吐剤（吐き気・おう吐を抑えるお薬）や止瀉剤（下痢止め）を予防的に服用していただくことがあります。
- インレビック服用中の吐き気やおう吐の症状は、インレビックを食事とともに服用することで軽減できることがあります。

● 骨髄抑制

好中球減少症、血小板減少症、貧血などの症状があらわれることがあります。血液検査の結果から、お薬を減らしたり、お休みする場合があります。次のような症状が認められた場合は、すみやかに医師に連絡してください。

次のような症状がみられる場合があります。

- | | | | |
|-------|----------|-----------|--------|
| 好中球減少 | ●突然の高熱 | ●さむけ | ●のどの痛み |
| 血小板減少 | ●あざがでやすい | ●血が止まりにくい | |
| 貧血 | ●顔色が悪い | ●疲れやすい | |

● 感染症

免疫の働きが低下し、感染症にかかりやすくなる場合があります。過去にウイルス性の肝炎にかかったことのある場合は再び症状があらわれることがあるため、あらかじめ医師に伝えてください。体の片側の一定の場所に、ピリピリとした痛みや、水ぶくれ（水疱）を伴う発疹（赤いぶつぶつ）が出た場合は、带状疱疹の疑いがあります。すぐに受診してください。感染を予防するために、手洗い、うがいなどしっかり行ってください。次のような症状が認められた場合は、すみやかに医師に連絡してください。

次のような症状がみられる場合があります。

- 発熱
- さむけ
- 体がだるい



● 肝機能障害

肝臓の機能が低下することがあります。血液検査では、AST、ALTなどが高くなります。血液検査の結果から、お薬を減らしたり、お休みする場合があります。

次のような症状が認められた場合は、すみやかに医師に連絡してください。

次のような症状がみられる場合があります。

- 体がだるい
- 発熱
- 吐き気、おう吐
- 食欲がない
- 白目や皮膚が黄色くなる
- かゆみ
- 腹痛

● ぶどう膜炎

ぶどう膜炎などの眼の異常があらわれることがあります。

ぶどう膜炎とは、眼球を覆っている「ぶどう膜」と呼ばれる組織に炎症が起こる病気で、重症になると視力が低下し、失明に至る場合があります。インレビックの服用に伴うぶどう膜炎は、治療を始めてから数カ月～2年以上経過してからあらわれることがあります(遅発性)。

次のような症状が認められた場合は、すみやかに医師に連絡してください。

次のような症状がみられる場合があります。

- 目がかすむ
- 視力の低下
- 視界にごみや虫のようなものが飛んでいるように見える
- まぶしい
- 目が痛い
- 目の充血
- 目がチカチカする



● 出血

血小板が減少することで、出血しやすくなる場合があります。

消化管に出血が起こると、血を吐いたり、便が黒くなることがあります。

次のような症状が認められた場合は、すみやかに医師に連絡してください。

次のような症状がみられる場合があります。

- あおあざがでやすい
- 鼻血/歯ぐきの出血
- 血が止まりにくい
- 血を吐く

● 脾炎

脾臓に炎症が起こることがあります。血液検査ではアミラーゼの増加やリパーゼの増加がみられます。

次のような症状が認められた場合は、すみやかに医師に連絡してください。

次のような症状がみられる場合があります。

- 腹痛
- 背中痛み
- 吐き気、おう吐

● 間質性肺疾患

空気中の酸素を血液に取り込むための器官である肺胞の壁やその周辺に、炎症が起こる病気です。

次のような症状が認められた場合は、すみやかに医師に連絡してください。

次のような症状がみられる場合があります。

- 息切れ
- 息苦しい
- 咳(から咳を含む)が出る
- 発熱

インレビック服用中に注意すべきことは？

骨髄線維症の経過中には、まれに急性白血病への移行（急性転化）がみられることがあります。そのため、体調の変化を見逃さず、毎回の受診や血液検査をしっかりと受けることが極めて重要です。

副作用だけでなく、進行に伴う症状や合併症にも注意が必要です。以下の症状が強くなることがありますので、気になる症状は医師に伝えてください。

貧血症状	息切れ、動悸、倦怠感
腹部症状	腹部膨満感、腹痛
出血症状	歯ぐきからの出血、あざ
全身症状	体重減少、発熱、寝汗（盗汗）

インレビック服用中にどんな検査をするの？

副作用を早期に発見するために、定期的にビタミンB₁濃度検査、認知評価、血液検査（血球数や肝機能の確認）などを行う必要があります。

また、目の異常がないかも定期的に確認が必要です。



治療に高額な医療費が必要ですか？

インレビックを含む薬剤費やその他の治療でひと月の医療費が高額になった場合は、「高額療養費制度」を利用することができます。

高額療養費制度とは、1日から月末までのひと月にかかった医療費に対し、年齢や収入に応じた自己負担限度額が設定されており、その額を超えた分の窓口負担額が軽減される制度です。

軽減された分は申請後に払い戻されます。マイナ保険証の提示により、限度額を超えた分の窓口支払いが不要になる場合があります。



また、同一世帯で直近の12カ月で高額療養費が支給された月が3カ月以上になった場合は、4カ月目から多数該当となり、自己負担限度額が軽減されます。

高額療養費制度の詳細については、加入されている保険組合にご確認ください。

高額療養費制度以外にも、医療費の負担を軽減できる場合があります。
各窓口でご確認ください。

民間の医療保険

民間の医療保険に加入している場合は、窓口にご確認ください。
骨髄線維症は、がん保険などの対象になる可能性があります。

各自治体の医療費助成制度

自治体によっては、骨髄線維症を指定難病として医療費助成制度を設けている場合があります。

お住まいの都道府県窓口に問い合わせしてみましょう。

※2026年4月時点において、東京都、埼玉県、富山県では助成制度を設けています。

付加給付制度

加入している健康保険組合によっては、独自に自己負担限度額を設定している場合があります。その場合の限度額は、高額療養費制度における自己負担限度額よりも低く設定されているため、自己負担がさらに軽減される可能性があります。

加入している健康保険組合に問い合わせてみましょう。

MEMO

医療機関連絡先

レコルダティ・レア・ディジーズ・ジャパン株式会社

インレビック®

HANDBOOK

インレビックカプセルを 服用される患者さんへ

インレビックは、1日1回服用する骨髄線維症のお薬です。

この冊子では、インレビックによる治療を始めるにあたり、患者さんに知っておいていただきたいことをまとめました。

骨髄線維症という病気のこと、インレビックの働きや服用方法、副作用について、治療開始前にお読みいただき、理解を深めるのにお役立てください。

わからないことや、不安に思うことなどは、医師や看護師、薬剤師にご相談ください。



CONTENTS


インレビックカプセルを服用される患者さんへ	1
どういう人がインレビックで治療をするの?	3
骨髄線維症になるとどんな症状が出るの?	6
どんな検査をして骨髄線維症を調べるの?	7
インレビック治療による効果は?	9
インレビック治療前に確認すべきことは?	10
インレビックの服用方法は?	12
インレビックにはどのような副作用があるの?	13
インレビック服用中に注意すべきことは?	19
インレビック服用中にどんな検査をするの?	19
治療に高額な医療費が必要ですか?	20

どういう人がインレビックで治療をするの？

インレビックは、「骨髄線維症」と診断された患者さんを治療するお薬です。
骨髄線維症は、骨髄の中にある造血幹細胞がもつ遺伝子に異常が生じ、骨髄内

正常な骨髄


骨髄の中には造血幹細胞があります。造血幹細胞は、血液成分のもとになる細胞で、この細胞から赤血球、白血球、血小板などの血液細胞がつくられます。



に線維質が増えて血液をつくる機能がうまく働かなくなる病気です。

骨髄線維症の骨髄

骨髄線維症は、造血幹細胞の異常によって、骨髄内に線維質が増えてしまう病気です。線維が増えた骨髄では、赤血球、白血球、血小板などの血液細胞を十分につくることができなくなり、骨髄の代わりに脾臓や肝臓で血液細胞がつくられることになります。



骨髄線維症の造血幹細胞ではいくつかの遺伝子変異がみられます。

そのひとつが、JAK2遺伝子の変異です。

JAK2遺伝子の変異すると、JAK2からの信号が過剰に働くことで骨髄の環境が変化（線維化）し、血液を作る働きが低下します。

JAK2以外の遺伝子変異として、JAK2からの信号を強くしてしまう遺伝子変異などが知られています。

骨髄線維症になるとどんな症状が出るの？

骨髄線維症になると、造血幹細胞の働きに異常が生じることで、貧血の症状(動悸・息切れ・倦怠感など)がみられます。

血液細胞を十分につくることができなくなった骨髄の代わりに、血液細胞をつくる働きを担う肝臓や脾臓が腫れることによって、腹部膨満感や腹痛、発熱や体重減少などの全身症状があらわれることがあります。

貧血症状



腹部症状



全身症状



どんな検査をして骨髄線維症を調べるの？

骨髄線維症を診断するための検査には、血液検査、骨髄検査、画像検査、遺伝子

血液検査

採取した血液を用いて、赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、白血球数および分画、血小板数などの数値の確認や抗原検査をします。また、診断時には血液細胞の変形を確認する血液形態検査も行います。



骨髄検査

骨髄に注射針を刺して、吸引した骨髄液を顕微鏡で見て、血液細胞がどのくらい産生されているか、異常があるかどうかを調べます。

骨髄の線維化が進行すると、骨髄液を吸引できなくなるので、その場合は骨髄の組織を採取して、線維化の状態を調べます。



骨髄穿刺・生検

検査などがあります。

画像検査

腹部エコー・CT・MRI・骨髄シンチグラムなどの画像診断をします。

骨髄の代わりに造血をする脾臓や肝臓の腫れや大きさを確認するため、腹部の画像診断が必要になります。



画像検査

遺伝子検査

骨髄線維症の約半数にJAK2遺伝子の異常が認められます。JAK2だけでなく、病気に関係する遺伝子の異常があるかどうかを確認します。

遺伝子検査は採取した血液で行います。



遺伝子検査

インレビック治療による効果は？

インレビックはJAK2を阻害するお薬です。

骨髄線維症になると、JAK2から伝えられる信号が強くなるため、骨髄で血液細胞を十分につくることができなくなります。その結果、脾臓や肝臓が腫れてしまい、その腫れに伴う症状があらわれます。

インレビックを服用することで、JAK2からの過剰な信号を抑え、脾臓の腫れを小さくしたり、全身症状を改善したりすることが期待されます。

インレビック治療前に確認すべきことは？

患者さんの状態によっては、インレビックを服用できない、もしくは投与量を調節する必要があります。

以下の項目に該当する場合は、治療開始前に医師とご相談ください。

- ☐ 薬や食べ物などでアレルギー反応が出たことがある
- ☐ 結核にかかったことがある
- ☐ 感染症(敗血症、肺炎、ウイルス感染など)で治療中
- ☐ B型肝炎で治療中、または以前治療していた
- ☐ 肝臓の病気がある
- ☐ 腎臓の病気がある、透析治療をしている
- ☐ 現在、他の薬を服用している
- ☐ 妊娠している、または妊娠の可能性がある
- ☐ 授乳している

現在、ほかに飲んでいるお薬がある場合は、医師、看護師、薬剤師に伝えてください。

一緒に飲むと、それぞれのお薬の効果に影響が出ることがありますので、追加でお薬を服用する場合は、医師、看護師、薬剤師にご相談ください。

● インレビックの副作用が出やすくなるお薬

リトナビル、イトラコナゾール、クラリスロマイシン、
フルコナゾール など

● インレビックの効果が弱くなるお薬

リファンピシン、フェニトイン、カルバマゼピン など

● インレビックと一緒に飲むことで、 相手のお薬の作用(副作用)を強めてしまうお薬

ミダゾラム、フェンタニル、トリアゾラム、オメプラゾール、
ランソプラゾール、ジアゼパム、メトプロロール、
アミトリプチリン、ペルフェナジン
メトホルミン、プロカインアミド など



インレビックの服用方法は？

● 1日1回服用してください。

通常、4カプセルを服用します。

患者さんの状態によっては、減量することがあります。

● 治療中は処方されたビタミンB₁ (チアミン) を毎日服用してください。

ビタミンB₁の吸収をよくするため、吐き気や下痢を抑える薬が処方されることがあります。

● 医師の指示に従って、服用してください。

- 飲み忘れた場合は、その日は服用せず、翌日の服用を予定していた時間帯に1回分を服用してください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- 妊娠する可能性のある人は、この薬を飲んでいる間および最後に飲んだ日から1カ月間は適切な避妊をしてください。



インレビック
カプセル100mg



インレビックには どのような副作用があるの？

インレビックを服用すると、以下のような症状が出ることがあります。
症状に気づいたら、すみやかに医師にご連絡ください。
症状が治まらない場合は、お薬を減らしたり、お休みする場合があります。

消化器症状	下痢、吐き気、おう吐、腹痛、便秘
全身の症状	貧血、頭痛、疲労感

そのほか、注意が必要な副作用があります(14～18ページ参照)。
以下の副作用が疑われる症状に気付いた場合は、服用を中止し、医師にご連絡ください。

注意が必要な副作用

- ウェルニッケ脳症
- 出血
- 骨髄抑制
- 肺炎
- 感染症
- 間質性肺疾患
- 肝機能障害
- ぶどう膜炎

注意が必要な副作用

● ウェルニッケ脳症

重大な副作用として、ビタミンB₁ (チアミン) の欠乏によりウェルニッケ脳症があらわれることがあります。

発症直後にビタミンB₁を大量に点滴することで回復が期待できますので、インレビックの服用中に以下の症状のいずれかが認められた場合は、インレビックの服用を中止し、すみやかに医師に連絡してください。

次のような症状がみられる場合があります。

- 意識の低下
- 意識の消失
- 考える力の低下
- 記憶力の低下
- 異常な行動
- けいれん
- 自分の意思とは関係なく身体が動く
- 手足の動きがぎこちない
- しゃべりにくい
- ふらつき
- まっすぐ歩けない
- 目を自由に動かせない
- 二重に見える



—— ウェルニッケ脳症を予防するために ——

- インレビック服用中は、医療機関より処方されるビタミンB₁を必ず毎日服用してください。
- インレビックの服用を始める前に血液検査でビタミンB₁濃度を測定し、値が低ければビタミンB₁補充を行います。ビタミンB₁濃度が正常値に回復するまでインレビックの服用を始めることはできません。
- インレビック服用中にも、必要に応じてビタミンB₁濃度の測定を行うことがあります。
- 下痢、吐き気、おう吐、食欲不振の症状などは、栄養失調や体重減少を引き起こしビタミンB₁欠乏の原因となるため改善が必要です。これらの症状がインレビック服用中に、日常的にみられる場合は、医師に相談してください。インレビックによるおう吐や下痢を軽減するために、制吐剤（吐き気・おう吐を抑えるお薬）や止瀉剤（下痢止め）を予防的に服用していただくことがあります。
- インレビック服用中の吐き気やおう吐の症状は、インレビックを食事とともに服用することで軽減できることがあります。

● 骨髄抑制

好中球減少症、血小板減少症、貧血などの症状があらわれることがあります。血液検査の結果から、お薬を減らしたり、お休みする場合があります。次のような症状が認められた場合は、すみやかに医師に連絡してください。

次のような症状がみられる場合があります。

好中球減少

●突然の高熱 ●さむけ ●のどの痛み

血小板減少

●あざがでやすい ●血が止まりにくい

貧血

●顔色が悪い ●疲れやすい

● 感染症

免疫の働きが低下し、感染症にかかりやすくなる場合があります。過去にウイルス性の肝炎にかかったことのある場合は再び症状があらわれることがあるため、あらかじめ医師に伝えてください。

体の片側の一定の場所に、ピリピリとした痛みや、水ぶくれ(水疱)を伴う発疹(赤いぶつぶつ)が出た場合は、帯状疱疹の疑いがあります。すぐに受診してください。感染を予防するために、手洗い、うがいなどしっかり行ってください。

次のような症状が認められた場合は、すみやかに医師に連絡してください。

次のような症状がみられる場合があります。

●発熱 ●さむけ ●体がだるい



● 肝機能障害

肝臓の機能が低下することがあります。血液検査では、AST、ALTなどが高くなります。血液検査の結果から、お薬を減らしたり、お休みする場合があります。

次のような症状が認められた場合は、すみやかに医師に連絡してください。

次のような症状がみられる場合があります。

- 体がだるい
- 発熱
- 吐き気、おう吐
- 食欲がない
- 白目や皮膚が黄色くなる
- かゆみ
- 腹痛

● ぶどう膜炎

ぶどう膜炎などの眼の異常があらわれることがあります。

ぶどう膜炎とは、眼球を覆っている「ぶどう膜」と呼ばれる組織に炎症が起こる病気で、重症になると視力が低下し、失明に至る場合もあります。インレビックの服用に伴うぶどう膜炎は、治療を始めてから数カ月～2年以上経過してからあらわれることがあります（遅発性）。

次のような症状が認められた場合は、すみやかに医師に連絡してください。

次のような症状がみられる場合があります。

- 目がかすむ
- 視力の低下
- 視界にごみや虫のようなものが飛んでいるように見える
- まぶしい
- 目が痛い
- 目の充血
- 目がチカチカする



● 出血

血小板が減少することで、出血しやすくなることがあります。
消化管に出血が起これると、血を吐いたり、便が黒くなることがあります。
次のような症状が認められた場合は、すみやかに医師に連絡してください。

次のような症状がみられる場合があります。

- あおざがでしやすい
- 鼻血/歯ぐきの出血
- 血が止まりにくい
- 血を吐く

● 膵炎

膵臓に炎症が起これることがあります。血液検査ではアミラーゼの増加やリパーゼの増加がみられます。
次のような症状が認められた場合は、すみやかに医師に連絡してください。

次のような症状がみられる場合があります。

- 腹痛
- 背中痛み
- 吐き気、おう吐

● 間質性肺疾患

空気中の酸素を血液に取り込むための器官である肺胞の壁やその周辺に、炎症が起これる病気です。
次のような症状が認められた場合は、すみやかに医師に連絡してください。

次のような症状がみられる場合があります。

- 息切れ
- 息苦しい
- 咳(から咳を含む)が出る
- 発熱

インレビック服用中に注意すべきことは？

骨髄線維症の経過中には、まれに急性白血病への移行（急性転化）がみられることがあります。そのため、体調の変化を見逃さず、毎回の受診や血液検査をしっかりと受けることが極めて重要です。

副作用だけでなく、進行に伴う症状や合併症にも注意が必要です。

以下の症状が強くなることがありますので、気になる症状は医師に伝えてください。

貧血症状	息切れ、動悸、倦怠感
腹部症状	腹部膨満感、腹痛
出血症状	歯ぐきからの出血、あざ
全身症状	体重減少、発熱、寝汗（盗汗）

インレビック服用中にどんな検査をするの？

副作用を早期に発見するために、定期的にビタミンB₁濃度検査、認知評価、血液検査（血球数や肝機能の確認）などを行う必要があります。

また、目の異常がないかも定期的に確認が必要です。



血液検査



ビタミンB₁
濃度検査



目の検査



認知評価

治療に高額な医療費が必要ですか？

インレビックを含む薬剤費やその他の治療でひと月の医療費が高額になった場合は、「高額療養費制度」を利用することができます。

高額療養費制度とは、1日から月末までのひと月にかかった医療費に対し、年齢や収入に応じた自己負担限度額が設定されており、その額を超えた分の窓口負担額が軽減される制度です。

軽減された分は申請後に払い戻しされます。マイナ保険証の提示により、限度額を超えた分の窓口支払いが不要になる場合があります。



また、同一世帯で直近の12カ月で高額療養費が支給された月が3カ月以上になった場合は、4カ月目から多数該当となり、自己負担限度額が軽減されます。

高額療養費制度の詳細については、加入されている保険組合にご確認ください。

高額療養費制度以外にも、医療費の負担を軽減できる場合があります。
各窓口でご確認ください。

民間の医療保険

民間の医療保険に加入している場合は、窓口にご確認ください。
骨髄線維症は、がん保険などの対象になる可能性があります。

各自治体の医療費助成制度

自治体によっては、骨髄線維症を指定難病として医療費助成制度を設けている場合があります。

お住まいの都道府県窓口にお問い合わせしてみましょう。

※2026年4月時点において、東京都、埼玉県、富山県では助成制度を設けています。

付加給付制度

加入している健康保険組合によっては、独自に自己負担限度額を設定している場合があります。その場合の限度額は、高額療養費制度における自己負担限度額よりも低く設定されているため、自己負担がさらに軽減される可能性があります。

加入している健康保険組合にお問い合わせしてみましょう。

MEMO

医療機関連絡先

レコルダティ・レア・ディジーズ・ジャパン株式会社

インレビック®

HANDBOOK